

印尼在发现首例猴痘病例后 全面加强了对猴痘的防范

(本报讯)在雅加达发现我国首例确诊的病毒病例后，卫生部正在加紧管理猴痘病例并限制病毒传播。

卫生部发言人 Mohammad Syahril 表示，政府正在努力采购约10,000支猴痘疫苗，并扩大实验室检测该疾病的能力。

“到目前为止，世界卫生组织 [WHO] 不建议大规模接种猴痘疫苗。但我们正在采购大约10,000种疫苗，只提供给患者及其密切接触者，” Syahril 在周六的新闻发布会上说。“当然，这些疫苗必须先得到食品和药物监测机构 [BPOM] 的批准，然后才能分发给公众。”

Syahril 补充说，卫生部还准备了大约1,200个用于猴痘检测的试剂盒，并正在努力增加十个实验室来检测这种疾病。

猴痘病例是通过取自一处或多处皮肤损伤或溃疡的病毒拭子进行聚合酶链式反应 (PCR) 测试来诊断的。我国目前只有两个实验室可以进行此类测试，一个在雅加达，一个在西瓜哇茂物。

Syahril 说，政府一直在加强边境管制措施，以应对猴痘的潜在传播。当局还敦促航空公司和港口当局注意出现疾病症状的乘客。

他说：“我们还敦促医护人员提高对猴痘病毒的警惕，

并在发现疑似患有这种疾病的患者时对自己进行教育，以遵循协议。”

首例确诊病例

周六，印度尼西亚宣布了首例确诊的猴痘感染，该感染是在一名曾在7月下旬至8月初前往欧洲的印尼公民身上发现的，我国已经确诊了这种疾病的病例。

该患者是一名27岁的男性，于8月11日开始出现症状。他于周四咨询了雅加达的一家医疗机构，在那里接受了猴痘检测。

“周五晚些时候，他被证实感染了猴痘。我们已跟进密切接触者的追踪，并将对其进行检查，” Syahril 说。

他补充说，患者仅表现出轻微症状，包括发烧、淋巴结肿大和皮疹——他目前正在家中自我隔离。

Syahril 敦促公众保持冷静，因为大多数感染猴痘病毒的人在几周内无需治疗即可康复。

“养成良好的卫生习惯和健康的生活方式，不仅可以预防猴痘，还可以预防其他传染病，”他说。

卫生部已在全国检测了其他22例疑似病例，所有病例均呈阴性。

据报道，自5月初以来，在猴痘流行的非洲国家之外，猴痘感染病例激增。案件

主要涉及但不限于男性性行为者。世界卫生组织于7月23日宣布这种情况为国际公共卫生紧急事件。

迄今为止，全球86个国家已报告超过39,700例猴痘确诊病例。

猴痘通过密切（通常是皮肤接触）传播，包括直接接触猴痘患者的皮疹、结痂或体液，接触已被病毒污染的表面或接触病毒感染者的呼吸道分泌物。

尽管在大多数情况下，症状会在几周内消退，但某些感染会导致严重的医疗并发症甚至死亡——尤其是在新生儿、儿童和有潜在免疫缺陷的人群中。截至周日，已向世界卫生组织报告了12人死于猴痘。

避免污名

公共卫生专家 Tjandra Yoga Aditama 表示，卫生当局需要采取六项措施来预测印度尼西亚的猴痘爆发。

“政府应加强猴痘监测，追踪患


者的密切接触者，使用良好的风险沟通方式，让公众参与疾病预防措施并推出疫苗，” Tjandra 周六在一份声明中说。

流行病学家 Dicky Budiman 还敦促政府加强对猴痘的监测，尤其是通过接触者追踪。“追踪过去三周内与第一位患者有过接触的所有人。如果可能，当局应追踪多层接触者。他们还应确保患者被隔离至少三周，”他说。

Dicky 还强调了在有关病毒的交流中避免使用可能使同性恋社区污名化的语言的重要性。

他说，由于同性恋社区的成员比普通人更容易感染艾滋病毒/艾滋病，因此总体而言，该群体患猴痘病毒严重症状的风险更大。

“因此，加强对这一高危人群的监测非常重要。加剧对猴痘的污名化只会阻止他们在感染该疾病时前往医疗机构。”（莉丽）



从与2003年草原土拨鼠暴发相关的临床样本中获得的猴痘病毒粒子在电子显微镜下，入被描绘在未注明日期的疾病控制中心讲义中。左边是成熟的椭圆形病毒颗粒，右边是未成熟病毒粒子的新月形和球形颗粒。

**印尼巴厘岛以南海域发生5.6级地震
震源深度130千米**

中新网8月22日电 据中国地震台网官方微博消息，中国地震台网正式测定：北京时间8月22日16时36分在印尼巴厘岛以南海域(南纬9.25度，东经115.65度)发生5.6级地震，震源深度130千米。